



**NÖROLOJ ANABİLİM DALI**  
**EVDE BAKIM HASTA DEĞERLENDİRME FORMU**

DOKÜMAN NO	HB.FR.47
YAYIN TARİHİ	17.04.2015
REVİZYON NO	01
REVİZYON TARİHİ	15.12.2015
SAYFA	1/1

**HASTANIN BESLENMESİ**

- Hastayı beslerken yarı oturur pozisyon verilmelidir.
- NG ile beslenen hastalarda hava verilmeye dikkat edilir.
- Her beslenmeden sonra en az 20 ml olacak şekilde su verilmelidir.
- Beslenen hastada mamayı verirken hastanın genel durumunda bir değişiklik olursa beslenmeye ara verilmelidir. (morarma, öksürük, bulma vb.)
- Beslenme sondasının uzunluğu kısıtlının kontrolü önemlidir, yerinde olup olmadığına bakılmalı, emin olunamazsa mama verilmemelidir.
- Genel olarak 24 – 06 saatleri arasında mama verilmemelidir.
- Beslenme ejektörü belirli aralarla temizlenmeli (su çekip içini yıkama) her bir sorun olursa (itememe gibi) değiştirilmelidir.

**SONDA BAKIMI**

- Hastanın idrar torbası vücut seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.
- İdrar torbası 2 – 3 günde bir değiştirilir, en fazla 12 saatte bir boşaltılmalıdır.
- İdrar miktarı olağandan az veya 4 – 6 saat boyunca gelmemesi tıkanıklık düşünülmeli kontrol edilir (kıvrılma olabilir) ve Dr'a haber verilir.
- İdrar içeriğinde partikül, kan, pıhtı vb. varsa Dr'a haber verilir.
- Günlük sonda ve bölge bakımı temiz sabunlu bezlerle yapılabilir, bölge temizliği ve travmayı yaparken dikkat edilmeli cilt tahrihidinden kaçınılmalıdır.

**AĞIZ BAKIMI**

- Hastanın ağızını temiz bir bezle yemek sodası veya karbonat ilave edilmiş suyla silinebilir.
- Günde en az 2 defa yapılabilir.
- Dudakların nemlendirilmesi sağlanır.

**HASTA BAKIMI**

- Hasta günde en az 2 saatte bir olacak şekilde pozisyon verilmelidir.
- Hastanın vücudunda sıyrık, kızarıklık, yara oluşması için günlük temizlik için ılık yumuşak bezlerle (alkol içermemeli) silin, uygun nemlendirici vücut losyonları, kremlerle bakımı sağlanmalı.
- Yatağın ve elbiselerinin düzgün ve kırık yırtık olmasına dikkat edilmelidir (pamuklu giysiler tercih edilebilir).
- Özellikle sırt, dirsekler, omuzlar, kalça, topuklar gibi kemik çıkıntılarının olduğu yerler mutlaka her gün 1 defa kontrol edilmelidir.
- Sonda bölgesinde pişik oluşması için uygun kremler pomadlar kullanılabilir.