



ACIL KULLANILACAK PEDAGOGİK LAÇ DOZLARI

DOKÜMAN NO	Y.LS.02
YAYIN TARİHİ	25.05.2012
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	21.04.2016
SAYFA	1 / 1

LACIN ADI	MEVCUT FORMLARI	DOZU	UYGULAMA YOLU	HAZIRLAMA
ATROPİN	0.5mg/ml	0.02mg/kg (Bir doz)	V ve O	
LİDOKAİN	%2 lik ve %10 luk ampuller	1mg/kg hızlı pu ne, ardından 20-50 µg/kg/dk hızında infüzyon	IVw	
ADRENALİN	0.25 mg/ml- 0.5 mg/ml	0.01 mg/ kg 1/ 10.000 likten 1 dz/ kg	IV- IO-ET	0.25 mg/ml ampul için hazırlama: 1 ml ilaç + 1.5 ml SF 0.5 mg/ ml ampul için hazırlama: 1 ml ilaç + 4 ml SF (ilaçlar bu şekilde hazırlanarak 1/10.000 lik hale getirilmelidir)
SODYUM BİKARBONAT	%8,4 sodyum bikarbonat 10ml ampuller	1cc/kg	IV	Distile su ile 1/1 oranında sulandırılır
DOPAMİN	200mg/5ml lik ampuller 250 mg/ 250ml solüsyon ??	2- 20mcg/kg/dk	IV	
DOBUTAMİN	10ml veya 20ml 250mg lik flakonlar	2-20mcg/kg/dk	IV	
KALSİYUM	%10 luk kalsiyum glukonat 10 ml lik ampullerde	25-50mg/kg	IV	SF ile 1/1 oranında sulandırılır

HAZIRLAYAN ECZANE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİMİ DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--------------------------------	---	-----------------------