



KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI
GÜVENL DO UM KONTROL L STES

DOKÜMAN NO	DH.LS.01
YAYIN TAR H	15.06.2016
REV ZYON NO	00
REV ZYON TAR.	-
SAYFA	1 / 2

Do um Öncesi

1.Ba vuru Anında	2. Do umdan Önce (veya Sezeryandan önce)
<p>Annenin sevki gerekiyor mu? Hayır Evet, planlandı.</p> <p>Annenin kronik hastalığı var mı? Hayır Evet</p> <p>Partograf baskı alındı mı? Hayır, 4 cm ve üstünde baskı olacaktır. Evet</p> <p>Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu? Antibiyotik Hayır Evet, verildi.</p> <p>Magnezyum sülfat? Hayır Evet, verildi.</p> <p>Anti-retroviral? Hayır, HIV negatiflik onaylandı Evet, verildi. Durum bilinmiyorsa, HIV testi istendi.</p> <p>Her vajinal muayenede el hijyeni ve eldiven kullanımı için yeterli malzeme mevcut Refakatçi do umda bulunması te vrik edildi. Anne veya refakatçinin do umda tehlikeli bir durum kar ısında yardım ça ıracağı onaylandı.</p>	<p>Birim kriterlerini kontrol edin.</p> <p>Serviks 4cm iken i aretleme ba layınız, serviks her 1 saatte en az 1cm geni lemelidir.</p> <ul style="list-style-type: none">Her 30 dk: Kalp atı ı, kontraksiyonlar, fetal kalp atı ıHer 2 saat vücut sıcaklığıHer 4 saat Kan basıncını kaydedin. <p>u durumlarda anneye antibiyotik veriniz.</p> <ul style="list-style-type: none">Vücut sıcaklığı >38°C iseKötü kokulu vajinal akıntı varsaAmniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise <p>u durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz.</p> <ul style="list-style-type: none">Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstüDiastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, iddetli baskı artışı, görü bozukluğu, epigastrik ağrı <ul style="list-style-type: none">CDA de eri 150 veya daha küçük olan veya klinik tanı tedavi gerekiyorsa verilir.CDA de eri 150'nin üstünde olan annelerde profilaksi amacıyla verilir. <p>Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu? Antibiyotik Hayır Evet, verildi.</p> <p>Magnezyum sülfat? Hayır Evet, verildi.</p> <p>Gerekli malzemelerin hasta yata ı yanında kullanıma hazır olması. Anne için: Eldiven Sabun ve temiz su 100IU enjektörde oksitosin</p> <p>Bebek için: Temiz havlu Göbek baskının kesilmesi için steril bıçak Aspirasyon cihazı Ambu</p> <p>Gerekti i durumda do uma yardım etmesi için asistan tanımlanıp ilgili ki i bilgilendirildi mi? Hayır Evet.</p> <p>3. sim sorgulama, do um kontrolü ve bileklik takılıp takılmadığı (anne ve bebek için) kontrolü yapıldı mı? Hayır Evet.</p> <p>Serviks 4cm iken i aretleme ba layınız, serviks her 1 saatte en az 1cm geni lemelidir.</p> <ul style="list-style-type: none">Her 30 dk: Kalp atı ı, kontraksiyonlar, fetal kalp atı ıHer 2 saat vücut sıcaklığıHer 4 saat Kan basıncını kaydedin. <p>u durumlarda anneye antibiyotik veriniz.</p> <ul style="list-style-type: none">Vücut sıcaklığı >38°C iseKötü kokulu vajinal akıntı varsaAmniyon kesesi yırtılmasının sonrasında 18 saat geçti ise <p>Anne bakımına do umun hemen sonrasında hazır olun..</p> <ul style="list-style-type: none">Bebe i ayırınOksitosini anneye ilk dakika içinde uygulayın.Plesentanın çıkışı için göbek baskının gerilmesini kontrol edin ve çıkışı sonrasında uterusu masaj yapın. <p>Bebek bakımına do umun hemen sonrasında hazır olun.</p> <ul style="list-style-type: none">Bebe i kurulaştırın ve sıcak tutun.E er nefes almıyorsa uyarın ve hava yolunu temizleyin.Nefes almama devam ediyorsa göbek baskını kesin, ambu setiyle ventilasyona ba layın.Yardım isteyin.



KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI
GÜVENL DO UM KONTROL L STES

DOKÜMAN NO	DH.LS.01
YAYIN TAR H	15.06.2016
REV ZYON NO	00
REV ZYON TAR.	-
SAYFA	2 / 2

Do um Sonrası

3.Do umdan hemen sonra (ilk 1 saat içinde)

Annede anormal kanama var mı?

Hayır
Evet, yardım ça rıldı.

Kanamanın 500ml üstü oldu u veya kanamanın 250 ml üstü ve annede aneminin mevcut oldu u durumlarda,

- Uterus'a masaj uygulayın.
- lave uterotonikleri dikkate alın.
- IV damar yolu açın.
- Tedaviye ba layın.

Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

Antibiyotik

Hayır
Evet, verildi.

Plesentanın manuel olarak çıkarıldı ı ve vücut sıcaklı ının 38°C üzerinde oldu u ü üme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.

Magnezyum sülfat?

Hayır
Evet, verildi.

u durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz.

- Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü
- Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü, iddetli ba a rısı, görü bozuklu u, epigastrik a rı

Bebe in sevki gerekiyor mu?

Hayır Evet, planlandı.

Birim kriterlerini kontrol edin.

Bebe in için ilaç gerekiyor mu?

Antibiyotik

Hayır
Evet, verildi.

- Anneye antibiyotik uygulamasının yapıldı ı,
- Solunum çok hızlı (dakikada 80 ve üstü) veya çok dü ük (dakikada 30 altında oldu u)
- Gö üste hırıltı sesinin, konvülsiyonların oldu u,
- Hareket veya uyarının görülmedi i durumlarda,
- Vücut sıcaklı ısıtma sonrasında 35:C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38:C'nin üstündeyse antibiyotik veriniz

Antiretroviral?

Hayır
Evet, verildi.

Annenin HIV+ oldu u durumda antiretroviral veriniz.

Bebe in özel bakım veya takibe ihtiyacı var mı?

Hayır Evet, planlandı.

- Emzirme ve cilt temasına ba landı
 Anne veya refakatçinin do umda tehlikeli bir durum kar ısında yardım ça ıraca ı onaylandı

Annenin kanama, ciddi abdominal a rı, iddetli ba a rısı, görü bozuklu u, nefes almada güçlük, ate , titreme veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebe in hızlı veya zor nefes alması, ate , normal dı ı so ukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı oldu u durumlarda

4. Taburculuk öncesinde

Annenin kanaması kontrol altına alındı mı?

Hayır (Tedavi edin ve taburcuuyu erteleyin)
Evet.

Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

Antibiyotik

Hayır
Evet (ilaç verin ve taburcuuyu erteleyin).

Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

Antibiyotik

Hayır
Evet: antibiyotik verin.
taburcuuyu erteleyin
özel bakım sa layın.

Vücut sıcaklı ının 38:C üzerinde oldu u, ü üme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.

- Solunumun çok hızlı(dakikada 60 üstü) veya çok dü ük(dakikada 30 altında) oldu u,
- Gö üste hırıltı sesinin, konvülsiyonların oldu u,
- Hareket veya uyarana cevap verilmeyen durumlarda,
- Vücut sıcaklı ısıtma sonrasında 35oC'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38oC'nin üstünde oldu u,
- Emmeyi kesti i,
- Göbek ba ının çevresinin cilde do ru kırmızıla ması durumlarında bebe e antibiyotik veriniz.

Bebek iyi besleniyor mu?

Evet
Hayır (Yardım edin ve taburcuuyu erteleyin)

Anneye aile planlaması seçeneklerinin sunulması gerekiyor mu?

Evet, bilgilendirme yapıldı.
Hayır

Do um sonrası için takip ayarlaması gerekiyor mu?

Evet, planlama yapıldı
Hayır

Anne veya refakatçi yardım ça ırması gerekti i durumlar konusunda bilgilendirildi mi?

Evet, planlama yapıldı.
Hayır

Annenin kanama, ciddi abdominal a rı, iddetli ba a rısı, görü bozuklu u, nefes almada güçlük, ate , titreme veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebe in hızlı veya zor nefes alması, ate , normal dı ı so ukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı oldu u durumlarda.